

PIGMENTATION CONJONCTIVALE CONGENITALE UNILATERALE

UNILATERAL CONGENITAL CONJUNCTIVAL PIGMENTATION

DIALLO Seydou¹

¹Ophthalmologiste, Institut d'Ophthalmologie Tropicale d'Afrique (IOTA), Bamako, Mali

Nombre de figure : 01

Reçu le 18 Aout 2019

Accepté le 30 Mai 2022

OBSERVATION

Le naevus conjonctival est une tumeur fréquente au niveau de la conjonctive. Il représente près de 30 % des tumeurs retrouvées à cette localisation. Ils peuvent apparaître cliniquement dans l'enfance ou à l'adolescence. En général stable dans le temps, le naevus conjonctival peut cependant présenter quelques lentes modifications de pigmentation ou de taille. Nous rapportons un cas de naevus conjonctival congénital, chez un garçon de 2 ans sans antécédent médical particulier amené par sa maman pour une tache noire constatée depuis la naissance et qui augmente lentement de taille. L'examen à la lampe à fente de l'œil droit a retrouvé un naevus conjonctival pigmenté d'environ 2 centimètres de longueur, plane, juxta limbique et bulbaire au niveau du côté temporal. Le reste de l'examen ophtalmologique était normal. Une photographie du segment antérieure a été réalisée (figure) et une

surveillance rigoureuse a été restaurée car le risque de transformation en mélanome malin conjonctival est possible même si cela reste rare.

Une surveillance semestrielle a été respectée et la pigmentation conjonctivale est restée stable à ce jour.

DISCUSSION

Le diamètre du naevus est en moyenne de 4 millimètres (mm) mais il peut varier de 0,2 à 30 mm. Les lésions géantes (diamètre supérieur à 10 mm) représentent 5 % des cas (1). Dans notre étude le diamètre du naevus était d'environ 10 mm. Dans notre étude le naevus conjonctival était pigmenté. Leur pigmentation peut varier (brun, bronzé, bleu) (2). La localisation limbique et bulbaire du naevus conjonctival dans notre étude est notée dans la littérature (3).




Figure 1: Photographie d'un naevus conjonctival pigmenté unilatéral droit

CONTRIBUTION DES AUTEURS

DS a apporté ses contributions substantielles à la conception du manuscrit, a fait la rédaction préliminaire de l'article, a donné son approbation finale de la version à publier et s'engage à assumer l'imputabilité pour tous les aspects de la recherche en veillant à ce que les questions liées à l'exactitude ou l'intégrité de toute partie de l'œuvre soient examinées de manière appropriée et résolues.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Shields CL et al. Giant conjunctival nevus : clinical features and natural course in 32 cases. *JAMA Ophthalmol.* 2013;131:857-63.
2. Shields CL, Fasiuddin A, Mashayekhi A, Shields JA. Conjunctival Nevi Clinical Features and Natural Course in 410 Consecutive Patients. *Arch Ophthalmol.* 2004;122:167-75.
3. Gerner N, Norregaard JC, Jensen OA, Prause JU. Conjunctival naevi in Denmark, 1960-1980: a 21-year follow-up study. *Acta Ophthalmol Scand.* 1996;74:334-37.